

**CASO APRESENTE ALGUMA  
FERIDA QUE NÃO CICATRIZA,  
PROCURE UMA UNIDADE DE  
SAÚDE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.**

**COORDENADORIA DE  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**REALIZAÇÃO:**



**Prefeitura Municipal de  
Barra do Garças**

**Secretaria Municipal  
de Saúde**

Impressão: Gráfica Multicor (66) 3401-2175

**BARRA DO GARÇAS**

**LEISHMANIOSE**

**EVITE O PIOR...  
PROTEJA SEU ANIMAL  
E SUA FAMÍLIA.**

## Como se transmite?

É transmitida ao homem somente pela picada de um inseto denominado flebotomíneo, conhecido também como “mosquito palha”, birigui”, “cangalhinha ou “tatuquira”. inseto se contamina após picar animais infectados.



## Você sabia?

O inseto vetor da leishmaniose é muito pequeno, medindo de 1 a 3mm de comprimento. Possui o corpo revestido por pêlos de coloração clara (castanho claro ou cor de palha). É facilmente reconhecido pelo seu comportamento, ao voar em pequenos saltos e pousar com as asas entreabertas.

Desenvolve-se em solo úmido e com matéria orgânica. As fêmeas alimentam-se de sangue de animais e pessoas no final da tarde e durante a noite.

De modo geral, os flebotomíneos habitam em ambientes silvestres, mas é possível encontrá-los também nas casas, galinheiros, chiqueiros, amontoados de madeiras, telhas e tijolos.

## Quais os principais sinais e sintomas clínicos da doença?

### - Tegumentar Americana

A doença pode levar de dois a três meses para se manifestar após a picada do inseto vetor, em geral apresenta-se uma ou mais feridas na pele que não cicatrizam. No início assemelham-se a picada de um inseto, aumentando de tamanho e profundidade até virarem feridas geralmente ovaladas ou arredondadas. Localizam-se geralmente nas partes expostas à picada do inseto (pernas, braços, mãos, rosto e pescoço).



### - Visceral

- Febre prolongada;
- Falta de apetite;
- Perda de peso;
- Aumento do fígado e baço;



## A doença tem tratamento?

- A leishmaniose tem tratamento para humanos. Ele é gratuito e está disponível na rede de serviços do Sistema Único de Saúde.

## Como podemos prevenir a doença?

### Cuidados individuais para evitar a picada do inseto transmissor

- Para as pessoas que trabalham na mata ou que fazem trilhas e passeios no ambiente silvestre, usar repelentes e camisas de manga comprida, calças compridas, meias e sapatos.
- Usar repelentes quando expostos a ambientes onde os insetos vetores possam ser encontrados.
- Evitar exposição nos horários de atividades dos insetos transmissores (crepúsculo e noite).
- Usar mosquiteiros de malha fina, bem como, telas em janelas e portas.

### Cuidados com o ambiente para evitar a proliferação do inseto

- Limpeza de quintais e terrenos baldios.
- Limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos (galinhas, porcos, cães, etc).
- Poda de árvores.
- Destino adequado de lixo orgânico (restos de frutas, folhas, fezes de animais, etc).
- Deixar os animais domésticos (galinhas, porcos, cães, etc) distantes do domicílio durante a noite.
- Evitar a construção de casas próximas às matas (faixa de segurança de 400 à 500 metros entre a casa e a mata).



Fonte de Alimento



Fonte de Alimento



Hospedeiro